


Zur

Kenntniss der Carbolintoxication.



INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der Doktorwürde in der gesammten Medicin

der hohen medicinischen Facultät


der kgl. Ludwig-Maximilians-Universität zu München

unter dem Präsidium

des Herrn Professor **Dr. O. Bollinger**

vorgelegt von

Albert Jansen,
pract. Arzt aus Hildesheim.



MÜNCHEN, 1884.

Druck von M. Ernst (vorm. G. Pollner).

Zur
Kenntniss der Carbolintoxication.

INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der Doktorwürde in der gesammten Medicin

der hohen medicinischen Facultät

der kgl. Ludwig-Maximilians-Universität zu München

unter dem Präsidium

des Herrn Professor **Dr. O. Bollinger**

vorgelegt von

Albert Jansen,
pract. Arzt aus Hildesheim.

MÜNCHEN, 1884.

Druck von M. Ernst (vorm. G. Pollner).

Seinem Freunde



Rudolf Stradal



gewidmet vom

Verfasser.

Als man die Carbolsäure in den Medicamenten-Schatz einführte, glaubte man, namentlich von englischer und französischer Seite, es mit einem ungefährlichen, indifferenten Körper zu thun zu haben. Seit durch Lister die Verwendung des Phenols eine allgemeine geworden, wurde erst schüchtern, dann mit Schärfe und Bestimmtheit auf Grund sich häufender klinischer Beobachtungen auf die Gefährlichkeit dieses Präparates hingewiesen. Pinkham schrieb bereits 1868: Carbolsäure sei ein der Oxalsäure und dem Strychnin in ihrer Gefährlichkeit wenig nachstehendes Gift. Durch Mittheilung seiner Beobachtungen auf dem Chirurgen-Congress 1878 hat vor allem Küster die Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand gelenkt. Carbolintoxicationen sind seitdem zu einer ständigen Rubrik der medicinischen Jahresberichte geworden. Die Literatur darüber ist umfangreich geworden, hat jedoch die im Interesse der Wissenschaft wünschenswerthe Klarheit über alle Details in der Wirkungsweise dieses Giftes noch nicht gebracht. Die experimentellen Arbeiten von Lemaire, Pinkham, Husemann, Paul Bert und Jolyet, Salkowski, Gies u. A. haben die giftige Natur der Carbolsäure für Thiere unzweifelhaft erwiesen und sie als hervorragendes Nervengift kennen gelehrt, die Symptome der Vergiftung und bei interner Darreichung die letale Dosis festgestellt und gezeigt, dass die toxische Wirkung je nach der Applicationsstelle an Intensität in folgender Reihenfolge ab-

nehme; 1) Die Infusion in eine Vene; 2) Clysmā; 3) intern; 4) auf intacte Haut; 5) auf eiternde Wundflächen; 6) Inhalation der Dämpfe.

Die Beobachtungen an Menschen haben von den Autoren mannigfache Auslegung gefunden, besonders die Intoxicationserscheinungen nach Application auf die intacte Haut und auf Wunden. Die Ansicht von Willis*), der in den Fällen von Machin (No. 60, 61, 62 der Tabelle) die Vergiftungssymptome auf gestörte Hautperspiration zurückführen wollte, ähnlich wie bei den Thieren, deren Haut man überfirnisst hatte, theilt Niemand mehr. Wicke**) und Zit***) suchen das toxische Moment in der Einathmung der Carböldämpfe. Müller†) erklärt geradezu, dass durch Einathmung von Phenöldämpfen noch nie eine Vergiftung vorgekommen sei, wogegen No. 4 und 5 der unten folgenden Tabelle sprechen. Allerdings ist dieser Weg beim Menschen den andern Applicationsstellen gegenüber ein relativ ziemlich ungefährlicher (Husemann). Hiller††) behauptet, dass in der chirurgischen Praxis die sog. Intoxicationserscheinungen nie bei vollständig reinen, von allen Fäulnissproducten freien Wunden vorkommen und bringt die Phänomene mit Erscheinen der Sepsis an der Wundoberfläche in Zusammenhang. Dagegen spricht unter anderem No. 113 meiner Zusammenstellung. Diese Ansicht hat keinen Vertreter mehr gefunden. Fritsch und Herdegen (No. 45, 46, 47) deuten ihre Fälle ebenfalls nicht als Carbolismus. Fritsch, welcher nach Irrigation des

*) Med. Times and Gaz. 1868. Pag. 314.

**) Wicke, Deutsche Klinik. 1869. Pag. 19 und 20.

***) Zit, Zur Casuistik der Carbolintoxication bei Säuglingen. Archiv f. Kinderkrankh. I. 1880. P. 445 u. No. 94 unserer Tabelle.

†) G. J. C. Müller, Virchow's Archiv LXXXV. P. 239.

††) Hiller, Deutsche Klinik. 1874.

Uterus mit Salicylsäure einmal ähnliche Erscheinungen mit Delirien und maniakalischen Anfällen sah, erklärt das Einströmen von Flüssigkeit in die geöffneten Venen als Ursache der gefährlichen Zufälle. Herdegen glaubt, dass durch Reizung der Uterusinnenfläche in Folge der Irrigation jene von Richter hystero-epileptiforme genannten Anfälle hervorgerufen wurden. Dieselbe Ansicht vertritt Bruntzel (Nr. 48)*). In der Berliner klinischen Wochenschrift 1878 finde ich von Frommel einen Fall angeführt, in welchem ähnliche Erscheinungen nach einer Vaginalirrigation aufgetreten sind. Er schliesst Luftembolie und Carbolintoxication aus und denkt sich die Zufälle durch Reflexaction entstanden. G. J. C. Müller**) stellt zwar die im Gefolge der Lister'schen Wundbehandlung vorkommenden Carbolismen, auch die meisten nach interner Darreichung auf Rechnung der Resorption; dagegen betrachtet er jene alarmirenden Vergiftungssymptome, die nach der Application der Carbolsäure sofort oder spätestens in 5 Minuten entstehen und entweder dem Tode vorausgehen oder in 1—2 Stunden wieder verschwinden, als bedingt durch einen Reflexact, der durch die örtliche Reizung und nicht durch Resorption hervorgerufen wird. Diesen Symptomencomplex: Schwindel, rauschartiger Zustand, Ohnmachtsgefühl, dann Bewusstlosigkeit, kleiner, schwacher Puls, häufig Cyanose, meist verengte Pupille, erhalte man am reinsten nach Application auf die äussere Haut (Nr. 60—65). Die locale Reizung der Magenschleimhaut nach interner Darreichung und der Darmschleimhaut nach Clysmata können in gleicher Weise solche Reflexaction hervorrufen. Müller beruft sich schliesslich auf den Car-

*) Bresl. ärztl. Zeitschrift, 1879.

**) A. a. O. P. 236.

bolismus, wie er nach Uterusirrigation auftrate. Er nennt dieses Bild Carbolismus acutissimus. Husemann und die meisten übrigen Autoren sprechen sich für die Resorption durch die Haut aus. Nothnagel und Rossbach bezeichnen letztere als sehr leicht von stattengehend. Langenbeck*) redet ihr mit viel Ueberzeugung das Wort; er führt als Beweis an Nr. 100.

Aus allen Beobachtungen geht hervor, dass die Reaction der einzelnen Individuen gegenüber diesem Präparate eine äusserst mannigfache ist. Während Marmou***) zum Verbande eines Krebsgeschwüres über 5 Pfund reine Carbolsäure verbraucht hat, ohne irgend welche Störungen zu sehen, bekam Lighfoot nach Gebrauch von 2 proc. Aqu. carb. (Nr. 70) Vergiftungserscheinungen, Abelin sogar mit tödtlichem Ausgange (Nr. 88). Es giebt Individuen, die nach jeder Operation, bei welcher viel Carbolsäure mit der Wunde in Berührung gekommen ist, abnorm hohe Temperatur bis zu 40° und mehr zeigen und jeden Verbandwechsel unter Carbolnebel oder mit Ausspülung der Wunde durch eine Steigerung der Temperatur beantworten. Der mechanische oder chemische Reiz reicht nach der Ansicht Küster's hierzu nicht aus. — Ein 20jähriger Patient durfte unbeschadet in 55 Tagen 78,0 Carbol (Kaposi), ein anderer in 3 Monaten 65,0 nehmen. Neumann***) sah bei einem 38jährigen Patienten nach 10 gran pro die jedesmal Intoxication (No. 8). Ein Kind, welches 0,20 und ein anderes, welches 0,30 genommen hatten, zeigten leichte Symptome von Vergiftung: grosse Unruhe u. s. w. Die gewöhnliche Dosis bei Menschen ist 0,1—0,5 pro die. Durch Ge-

*) Langenbeck, Klin. Beiträge zur Lehre von der Carbolintoxication. Berl. klin. Wochenschrift 1878. P. 412.

**) Deutsche Klinik 1872. P. 353.

***) Archiv für Dermat. I. pag. 350.

wöhnung haben es Männer auf 3,0 pro die gebracht. Bei habituellen Trinkern erfolgt die Gewöhnung rascher; Frauen und Kinder vertragen weniger als Männer.

Im Vergleiche zu der häufigen Anwendung des Lister'schen Verfahrens sind Intoxicationen in der chirurgischen Praxis selten. Vielleicht schafft die Carbonsäure vermöge ihrer Affinität zu den Eiweisstoffen des Wundsecrets sich selbst eine impermeable Decke (Husemann). Mit dem höhern Concentrationsgrade würde man demnach die Gefahr der Resorption vermindern. Dagegen macht nach demselben (Handbuch der Arzneimittellehre) der Umstand, dass gerade das Ausspülen der Wunden mit concentrirten (5 %) Lösungen derartige Vergiftungen erzeugt, es gerechtfertigt, nur diluirte Lösungen zu verwenden.

Begünstigende Momente für die Phenolintoxication sind nach den Erfahrungen von Billroth, Küster u. A.: Anämie, Fieber, besonders septisches und pyämisches, kindliches und sehr hohes Alter, schwächliche Constitution, Ort und Zeit der Application, gewisse, individuelle Prädisposition. Allgemein gelten Frauen und besonders Kinder als weniger widerstandsfähig.

Als bekanntestes Symptom der Resorption von Carbol gilt der mehr oder weniger dunkelgefärbte Harn; ein constantes ist er nicht. Am dunkelsten ist der Urin nach Salkowski bei äusserer Applikation. Salkowski nimmt deswegen an, dass die Carbonsäure bereits im Contacte mit offenen Wunden oder auf der Hautoberfläche eine Umsetzung erfahre („intermediäres Oxydationsprodukt“), die zur Resorption komme und durch den Urin wieder ausgeschieden werde. Der Grad der dunkeln Verfärbung weisst keineswegs auf einen entsprechenden Gehalt an Phenol oder auf den Grad der Intoxication hin. Individuelle Verhältnisse

der Resorption und der Fähigkeit des Ausscheidens sind hier sehr in Anschlag zu bringen (Billroth)*). Allerdings ist es eine abnorme Seltenheit, sagt Billroth, dass die dunkle Farbe des Harnes bei einem mit Carbolsäure Behandelten fehle; dem Auftreten der Vergiftungserscheinungen gehe sie regelmässig voraus. Doch geben Hiller, Sonnenburg u. A. ausdrücklich an, dass der Harn Schwervergifteter nicht selten eine goldgelbe-goldbraune Farbe zeige, die freilich bei längerem Stehenlassen an der Luft ins olivengrüne übergehe. Andererseits war schon das wiederholte Eintauchen der unverletzten Finger in die Carbollösung — vielleicht in Combination mit längerem Aufenthalt in der Sprayatmosphäre — bei einigen Assistenten Billroths im Stande, dunkelgrünen Harn hervorzurufen.

Bessere Anhaltspunkte für die Diagnose einer stattgehabten Vergiftung und zugleich für die bestimmte Indication, das Phenol fortzulassen, liefern die übrigen Intoxicationserscheinungen, nach Salkowski besonders die gastrischen, nach Sonnenburg mehr die nervösen. Die Verdauungsstörungen bestehen in Appetitlosigkeit, Diarrhöen, die bisweilen grünliche Verfärbung zeigen, Erbrechen. Bei Besprechung des Falles von Lighfoot (No. 70)**) bemerkt Husemann, dass sonst nirgends Erbrechen als Intoxicationsphänomen constatirt sei; in seinem Handbuche der Arzneimittellehre erklärt derselbe Autor wiederholtes Erbrechen für ein dem Carbolismus acutus fremdes Symptom. Als Zeichen der chronischen Vergiftung führt Volkmann Erbrechen an. Küster hält Erbrechen für ein fast regelmässiges Symptom. Thatsache ist, dass

*) Billroth, Chirurgische Klinik 1871—76.

**) Deutsche Klinik 1872.

es in manchen Fällen als hartnäckigstes Phänomen der stattgehabten Intoxication auftritt und oft der Application in Kürze folgt. In nachstehender Tabelle haben wir im Ganzen 29 mal Erbrechen verzeichnet, in den chirurgischen Fällen allein 21 Mal.

Die nervösen Störungen sind mannigfach. Uebelkeit, Kopfweh, Schwindel, Ohnmacht, Stupor, Bewusstlosigkeit, Collaps, Aufregung, rauschartiger Zustand bis zu Delirien, stertoröses Athmen, schwacher, frequenter Puls, vermehrte Schweisssecretion (nach Neumann, Winslow, Shaw), Verlust der Sensibilität, der Reflexerregbarkeit, Zittern, Krämpfe (tonische und klonische) sind die Symptome, deren man je nach dem Intoxicationsgrade in grösserer oder geringerer Vollständigkeit bei den einzelnen Fällen begegnet. Vielfach findet man in der Literatur — so bei Husemann, Nothnagel und Rossbach, Küster u. A. — die Angabe, dass bei Menschen nur ganz ausnahmsweise jene tonischen und klonischen Krämpfe auftreten, welche das Vergiftungsbild bei Thieren zu einem so ausgeprägten machen. In 20 Fällen der Tabelle sind Convulsionen angeführt. Scheidet man die schweren von den leichten Intoxicationsgraden aus und berechnet man die Häufigkeit des Vorkommens von Convulsionen unter den schweren Graden in Procenten, so ergibt sich für die Intoxication

durch Inhalation	(1:2)	=	50%
„ interne Applic.	(5:20)	=	25%
„ Clysmata	(4:6)	=	66,66%
„ Uterusirrigation	(3:8)	=	37,5%
„ Applic. auf die			
äussere Haut	(1:9)	=	11,11%
„ chirurg. Anw.	(6:28)	=	21,4%
im ganzen	(20:73)	=	27,4%

d. h. in fast einem Drittel der Fälle sind Convulsionen

zu verzeichnen und zwar in überwiegender Mehrzahl nach der Application auf Schleimhäute. Von den 20 Fällen kommen 9 auf Kinder.

Ueber die Art der Einwirkung auf das Nervensystem sind die Ansichten getheilt. P. Bert und Jolyet fanden zufolge ihrer Thierversuche die Reflexerregbarkeit des Rückenmarkes erhöht, ferner, dass die erst erhöhte Sensibilität vernichtet würde, wenn in Folge der Convulsionen Erschöpfung des Rückenmarkes eingetreten sei. Der Tod wurde durch Vernichtung der excitomotorischen Eigenschaften des Rückenmarkes bedingt. Nach Husemann wirkt sie analog dem Alkohol erst reizend, dann lähmend auf das Respirationscentrum, der Herzschlag erlischt später als die Athmung. Salkowsky nimmt combinirte Reizung des vagus und des respiratorischen Centrums an; letzteres geht, indem sich Kohlensäure anhäuft, in Lähmung über und führt den Tod durch Asphyxie herbei. Weiss*) glaubt die Convulsionen auf idiopathische Reizung der Krampfcentra durch das Gift beziehen zu müssen und nimmt als »Grund dieser nach Carbolwirkung anormalen Reizbarkeit des excitomotorischen Centrums nach Baumes individuelle Convulsionabilität an«, die bei Säuglingen in so hohem Grade vorhanden sei. Gies**) hat durch seine Experimente erwiesen, dass durch jede, selbst durch die kleinste Menge (ins Blut eingeführt), das vasomotorische Centrum in der medulla oblongata gelähmt und dadurch eine Erweiterung des gesammten Gefässgebietes sowie Sinken des Blutdruckes herbeigeführt werde. Bei kleineren und mittleren Dosen tritt der Tod durch Lähmung des Respirationscentrums ein; nach grössern

*) Weiss, Prager med. Wochenschrift 1878. P. 369.

**) Gies, Arch. für experim. Pathol. und Pharm. XII. p. 401.

entsteht neben Respirations- auch Herzstillstand. Müller erklärt die Einwirkung zum Theil als eine reflectorische.

Die Ausscheidung der Carbolsäure in den Harn geht sehr rasch vor sich; Retention des Phenols im Körper findet nicht statt; eine cumulative Wirkung ist daher nicht zu befürchten und chronischer Carbolismus nicht vorhanden. Gegen diese Ansicht Salkowski's haben sich Billroth*), Küster**) u. A. entschieden ausgesprochen. Sie haben die Beobachtung gemacht, dass die toxische Wirkung noch anhält, wenn man die Carbolsäure auch nicht mehr anwendet; dass die Symptome der Vergiftung allmählich aufhören: so war 14 Tage nach Fortlassen derselben der Urin noch grün. Wenn also das Phenol im Körper sehr lange zurückgehalten werden kann, so dürfte die Annahme einer cumulativen Wirkung im Organismus unzulässig sein. Nach Küster erträgt der Körper bei längerer Aufnahme der Carbolsäure die dadurch bedingten Störungen (Entziehung der Schwefelsalze zur Bildung von Phenylschwefelsäure) nicht und erliegt marastisch. Er schlägt für solche Fälle (wie z. B. N. 85) den Namen Carbolmarasmus vor.

Küster unterscheidet drei Stadien der Intoxication. Zum ersten rechnet er die Fälle, deren Hauptsymptom die Verfärbung des Harnes ist; zum 2. die, welche einhergehen mit Kopfschmerz, Appetitlosigkeit, Ekel, Erbrechen, Schwindel, Mattigkeit, Ameisenkriechen, vermehrter Schweiss- und Speichelsecretion, Schwerbeweglichkeit der Pupille, bisweilen Dysphagie,

*) A. a. O.

**) Küster. Von den giftigen Eigenschaften der Carbols. Archiv für klin. Chir. 1878 p. 122.

desgleichen den chronischen Carbolismus oder Carbolmarasmus, der sich besonders durch Erbrechen und Collapszustände kennzeichnet. Für das dritte Stadium ist das Auftreten schwerer Hirnsymptome charakteristisch: Verlust des Bewusstseins, der Sensibilität, der Locomotion, schwerer Collaps und Blässe des Gesichts, stertoröse Respiration, kalter klebriger Schweiß, frequenter, schwacher Puls, Convulsionen, besonders bei kleinen Kindern, Delirien und grosse Irritabilität. Während die Kliniker sonst im allgemeinen 2 Formen von Carbolismus unterscheiden, den acuten und den chronischen oder Carbolmarasmus, hat G. J. C. Müller jene oben erwähnten stürmischen Vergiftungsfälle davon getrennt, und unter dem Namen Carbolismus acutissimus zusammengefasst und als durch Reflexaction hervorgerufen bezeichnet. Die chronische Vergiftung scheint häufiger nach äusserem als nach innerem Gebrauche beobachtet zu sein (Sonnenburg).

Collaps mit niederer Temperatur und Reizerscheinungen mit höherer Temperatur wurden beide sowohl bei sehr grosser als bei minimaler Dosis beobachtet. Nach Küster findet bei kleinen und mittleren Gaben in den nächsten Stunden constant Temperaturerhöhung statt. Bei schneller Einverleibung von noch nicht absolut tödtlicher Gabe folgt die Temperaturerhöhung erst einem starken Sinken. Bei absolut letaler Dosis fehlt oft jede Erhöhung; die Temperatur sinkt fortwährend.

Die Carbolsäure wird als solche resorbirt und von den Organen aufgenommen. In den Fällen No. 10, 21, 30 rochen Blut oder Organe danach. Das Gehirn nimmt von allen am meisten Phenol auf. Mit der Schwefelsäure des Organismus verbindet es sich zu Phenylschwefelsäure. Ausgeschieden wird es in erster Linie durch die Nieren. Im Speichel hat man es

nachgewiesen. Lemaire hielt die Absonderung in der Athemluft für unwahrscheinlich. Dagegen führe ich Fall No. 22, 50, 61, wo die Expirationsluft deutlich nach Carbolsäure roch, sowie die Angabe von P. Bert an, derzufolge in seinen Thierversuchen häufig Pneumonien dem Tode vorangingen, wie er annimmt in Folge der Elimination des Giftes durch die Lungen.

Abgesehen von dem nicht untrüglichen Merkmale der Farbenveränderung bietet der Carbolharn folgende Eigenthümlichkeiten. Die schwefelsauren Salze schwinden, an deren Stelle treten die gepaarten Schwefelsäuren, Phenylschwefelsäure. Um diese für Carbolharn charakteristische Veränderung nachzuweisen*), säuert man den von Eiweiss befreiten Harn mit Essigsäure an, versetzt ihn mit überschüssigem Chlorbarium. Der entstehende Niederschlag besteht im wesentlichen aus schwefelsaurem Baryt. Bei normalem Harn bekommt man milchartige, bei Carbolharn schleierhafte Trübung; in hochgradigen Fällen bleibt der Harn ganz klar. Das dunkelwerden des Urines bei längerem Stehenlassen erklärt sich dadurch, dass die farblose Hydrochinonschwefelsäure, ein Abkömmling der Phenylschwefelsäure, in ihre Componenten zerfällt und das freigewordene Hydrochinon zu gefärbten Produkten oxydirt. Nach grösseren Gaben beobachtete Kohn Albuminurie; nach kleinern ist dies eine Seltenheit. 2 Fälle von Hämoglobinurie sind nach Husemann bei Vergiftung mit spirituöser Lösung vorgekommen. Ich fand in der mir zugänglichen Literatur nur einen Fall No. 40.

Da die Phenylschwefelsäure ungiftiger Natur ist, so lag es nahe, durch Vermehrung der Schwefelsäure im Organismus die Bildung derselben zu beschleunigen. Nach dem Vorgange von Baumann gab Sonnen-

*) Baumann'sche Probe.

burg*) seinen Patienten Acid. oder Natr. sulf. und hat befriedigende Resultate gesehen. Auf Grund seiner Thierversuche bestreitet Küster den Erfolg dieser Therapie entschieden. In den leichten Fällen genügt das Weglassen des Giftes, um eine Besserung herbeizuführen. Nach innerlicher Application ist Erbrechen und schleunige Anwendung der Magenpumpe indicirt. Mosler rühmt daneben eine reichliche Venäsection (No. 21). Shaw führt die Besserung seines Falles auf wiederholte Injection von Ammoniak in eine Vene zurück. Husemann empfiehlt als bestes Antidot Calcaria saccharata.

Der Sectionsbefund an Carbolintoxication Gestorbener bietet wenig charakteristisches. Gehirn, Leber, Nieren, Milz sind meist mit dunklem, dünnflüssigen, wenig geronnenen Blute gefüllt, wie beim Tode durch Asphyxie. Leber und Epithelien der Nieren zeigen bisweilen geringe Verfettung. Im Blute ist meist Phenol chemisch nachweisbar; selten riechen Blut oder Organe danach.

Die Carbolsäure erweist sich als ein Gift, das in geringen Dosen schnell durch die Nieren ausgeschieden wird, ohne weitere Erscheinungen hervorzurufen, dass aber in grösseren Gaben die nervösen Centralorgane in immer wachsendem Grade betheiligt, zunächst reizend, dann lähmend, bis endlich durch Lähmung des Respirationencentrums der Tod eintritt.

Falk*) hat seit 1868 87 Vergiftungsfälle in der Literatur gefunden. Von diesen ist ein in 9 Stunden letal verlaufender Fall durch carbolsaures Natrium hervorgerufen, ein anderer identisch mit No. 5 unserer Tabelle.

*) Sonnenburg, Zur Diagnose und Therapie der Carbolintoxication. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. IX. P. 356.

**) Falk, Handbuch der Toxikologie. P. 95.

Von den übrigen 85 Fällen, die auf die Einwirkung des Phenols in flüssigem Zustande auf den menschlichen Organismus zurückzuführen sind, verliefen 50 letal. Auf innerliche Application fallen von diesen 45 Fälle (35 letal), auf antiseptische Wundbehandlung 27 (8 letal); auf die Application per clyisma 4 (1 letal). Als minimal letale Dosis für Erwachsene bezeichnet diese Casuistik ca. 15 Gramm bei der innerlichen Darreichung.

Ich habe in der mir zugänglichen Literatur — theils im Original, theils im Auszuge — in nachstehender Tabelle aufgeführte Fälle von Carbolvergiftung gefunden. Der Vollständigkeit halber nahm ich auch die leichtern Intoxicationen auf, liess indess jene namentlich in der chirurg. Praxis zahlreich beobachteten Fälle bei Seite, welche lediglich durch dunkle Färbung des Harns die Carbolresorption ankündigten. Neben der laufenden Nummer habe ich im Interesse der Uebersichtlichkeit die Fälle der einzelnen Gruppen mit Specialnummern versehen. Die Gruppen folgen sich in der Tabelle in dieser Reihenfolge: 1) kommen die Intoxicationen durch Inhalationen; 2) durch innerlichen Gebrauch; 3) per clyisma; 4) durch Uterusirrigationen; 5) durch Application auf die äussere Haut; 6) durch antiseptische Wundbehandlung.

Lauf. No.	Spec. No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung, Concentration
-----------	-----------	-----------------------	----------------------	-----------	---

I. Intoxicationen

1	1	Lemaire	Mann	Selbstversuch	10 Min. lang verdunstete Carbolsäure eingeathmet
2	2	Fuller	?	—	Zerstäuben von Carbolsäurelösungen 5 bis 10 Tr. : 1 Unz. Wasser
3	3	Marcet, Thepractionner I, 265	?	Phthyse	Inhalationen zerstäubter 2 grüner Carbolösungen
4	4	Zillner, Wien. med. Presse 1879 No. 47	M. 27 J.	—	War 2 Tage lang im geschlossenen Keller mit Umfüllen chem. reiner Carbolsäure beschäftigt
5	5	Unthank, Brit. med. Journ. 1872 No. 23	M. ?	—	3 stündige Einathmung von Carböldämpfen in einem Stalle

II. Intoxicationen

6	1	Neumann, Arch. f. Derm. I, p. 350	M.	Psorias invet.	12—14 gran pro Die in Pillenform
7	2	— ibid.	M. 25 J.	Psoriasis orbic.	Begann mit 10 gran, stieg bis 40 gran pro die in Solutio

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
----------	----------	---------	------------------------

durch Inhalation.

—	Trockenheit im Mund, Schwere des Kopfes.	—	G.
—	Ohnmachten.	—	G.
—	Schwindelzufälle.	—	G.
—	4—6 St. dauernder rausch- artiger Zustand mit bedeu- tender Aufregung, auf den Bewusstlosigkeit folgte. Harn dunkelbraun.	—	G.
Nach einem warmen Bade Besserung	Stertoröse Athmung, Asphyxie; Cyanose. Schwindel, Stupor; Coma. Convulsionen, Trismus.	—	G.

durch innerliche Anwendung.

Nach Aus- setzung des Mittels schwin- den die Er- scheinungen	Von Zeit zu Zeit Schwindel, Mattigkeit in den Knien, Ringesehen, Ameisenkriechen.	—	G.
—	Schwindel, Kopf eingenommen, sehr starker Schweiss.	-	G.

Lauf. No.	Spec.-No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung, Concentration
8	3	Neumann, Arch. f. Derm. I, p. 350	M. 38 J.	Psoriasis orbic.	10 gran pro die in Solutio. Intox. jedes- mal
9	4	— ibid.	M. 25 J.	„ „	Von 6 bis 15 Pillen pro die steigend. Intox. nach 9 Pillen
10	5	Zillner, Wien. med. Presse 1879 Nr. 47	W. 30 J.	Fieber, Milztumor, Magen- u. Darm- catarrh	1 Löffl. sehr concentr. Carbollösung, die zu äusserl. Anwendung im Zimmer stand
11	6	Salmon, Arch. f. Kinderheil- kunde B. V. Heft 7—8	? 14 T.	—	Intox. sofort. $\frac{1}{2}$ Löffel einer Lösung Spir. vin. Acid. carb. aa part.

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
Die Dosis in Pillen wird er- tragen	Schwindel, Kopfschmerz, Schwä- che in den Beinen, Betäubung.	—	G.
—	Schwindel, Kopfschmerz, Zu- stand von Trunkenheit.	—	G.
—	Puls klein und unbestimmbar, schwache Herzthätigkeit. Respiration frequent und ober- flächlich. Haut an den Extremitäten kühl. Sofort Collaps bis Tod nach 3 $\frac{1}{2}$ St.	Rechte Pupille hanf- korngross, linke Pu- pille mittelweit, Hirn und Hirnhäute blut- reich, Hirn schwach nach Carbolriechend. In den Blutleitern mässig viel dunkles flüssiges Blut. Lun- gen blutreich, auf den Durchschnitten nach C. riechend, wie auch der Schleim in d. Luftröhre. Bauch- höhle nach C. rie- chend, Leber mässig blutreich.	† nach 3 $\frac{1}{2}$ St.
—	Leichte Carbolfarbe des Urins am folgenden Tage. Wiederholtes Erbrechen. 2 Tage später Heiserkeit. Malariaartiger Ausschlag. Zittern der Extremitäten. Leichte Schlingbeschwerden, die, bis ins dritte Jahr bald mehr bald weniger vorhanden, durch Oesophagotomie entfernt wer- den.	—	G.

Lauf. No.	Spec. No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung, Concentration
12	7	Mraček, Wien, med. Woch. 1879, p. 882	M. ?	gangränesc. Adenitis	1 Esslöffel einer conc. 83,3 % Carbollösung = 10,8 gr. acid. carb. Intox. sofort
13	8	Oberst, Ein Fall von acut. Carbolism. Berl. klin. Mitth. 1878 p. 157.	M. 32 J.	—	Trank statt Bitterwasser 1 Glas (180,0) 5 % Carbollösung = 9,0 gr. acid. carb.
14	9	Barlow, Lancet II, 12. Sept. 1869	M. 60 J.	trunken	Trank ca. 30,0 gr. zur Vertilgung von Ungeziefer dienende Carbolsäure

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
— Durch Wy- mann'sche Ma- genpumpe nach ca. 15 M. 150 gr. aus d. Magen ent- fernt, dann 2 Ltr. H₂O. durchgespült	Obstipatio, Urin 2 Tage oliven- farbig, dunkel, reichl. Carbol enthaltend. Puls 84, klein, aussetzend. Respiration sehr oberflächlich. Haut, besonders an den Extre- mitäten kühl, mit klebrigem Schweiss bedeckt. Bewusstlos, nach $\frac{1}{3}$ St. völlig collabirt, Temp. ($\frac{1}{4}$ St. nachher) 35,8. Heftige Convulsionen, Zucken in den Extremitäten. Augenlider halb geöffnet, re- gungslos. Urin dunkel grünlich schwarz, sauer, obwohl vorher wegen Cystitis alkalisch. Urin bleibt sauer, Puls klein, leer, fast unfeelbar. Respir. mühsam, stöhnend. Gesicht bleich, klebr. Schweiss, Extremitäten kühl. Nach 3 Min. bewusstlos. Temp. wenig erniedrigt. Un- ruhe. Hin- und herwerfen. Mimische Gesichtsmuskeln con- vulsivisch zuckend, Extre- mitäten heftig zitternd, heftiger Trismus. Bauchmuskeln ge- spannt.	— Cystitis in d. Heilung beschleunigt, d. Harn nie wieder alkalisch.	G. G nach 3 St. erholt er sich
—	Collaps, Schaum vor dem Mund.	Stark gerunzelte Mu- cosa des Magens. Lunge blutreich. Schädeldecke auch. Harn blass.	† nach weni- gen Min.

Lauf. No.	Spec. No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung, Concentration
15	10	v. d. Weyde, Philadelph. med. a. surg. report. XIX. p. 122. 1868	M.	Zahnschmerz	Lässt sich eine grössere Menge Carbolsäure in den Mund durch einen Schlauch laufen
16	11	Müller, Würt. Corresp.-Blatt. XXXIX. p. 337. 1869	W. 2 J.	—	Trinkt 20 bis 30 Tr. Kreosot
17	12	Haustoun, Philad. med. a. surg. repord. XXII. p. 32. 1870	M. 32 J.	—	Trank $\frac{1}{2}$ Unze öliger Carbollösung aus Versehen. Intox. sofort
18	13	Jeffreys and John Hainworth Med. Times and Gaz. 1871. p. 423	M. 65 J.	—	Trank $\frac{1}{2}$ —1 Unze zu Reinigungszwecken bewahrte Carbollösg.

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
—	Bewusstlos.	—	† bald nach- her
—	Urin braun. Würgen und Erbrechen. Stertoröses Athmen, Erstickungs- anfälle. Bewusstlos. Zuckungen, Schlucken unmöglich.	Gehirn, Lunge, Unter- leibsorgane reich an dunklem Blut. In den Herzventrikeln eben solch Gerinnsel.	† nach 17 St.
Nach 15 Min. Magenpumpe	Kein Erbrechen. Puls unfühbar, Herzschlag kaum vernehmbar. Respiration stertorös. Kalter klebriger Schweiss. Nach 5 Min. bewusstlos, keine Krämpfe.	Blut dünnflüssig, Hirn congestionirt, sinus stark gefüllt, Venen ebenso. Magen- und Duodenum-Schleim- haut zerstört (ver- kohlt).	†
—	Herzschlag kaum vernehmlich. Aussetzen der Respiration. Schaum vor dem Munde. Besinnungslos.	Blut dunkel, dünn- flüssig. In Trachea und Bronchien blu- tiger Schleim. Bauch- eingeweide congest. nach Carbol riechend. Tod durch Erstickg.; durch Hypersecreti- on der Lunge An- füllung der Alveolen mit Schleim.	† bald

Lauf. No.	Spec. No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung, Concentration
19	14	Ogston, Brit. med. Journ. 1871 p. 116	M. 47 J.	—	Trank statt d. Schnap- ses 1-- 2 Unzen roher Carbolsäure. Geht dann zu einem Dro- gisten. Intox. nach cr. 15 Min.
20	15	Wiltshire, Med. Times a. Gaz. 1870, p. 474	junger, Marn	Typhus abdomi- nalis	Trank aus Versehen 1 Esslöffel starker zur Desinfection bestimm- ter Carbolsäure
21	16	Mosler, Deutsches Archiv für klin. Med. 1872, p. 113	M. ?	—	Trank ein Schnaps- glas von Lösung Acid. carb. Spir. sap. aa part. ca. = 11,0 gr. Acid. carb.
22	17	Brabant, St. Georg's Hospit. Lancet 1. 9. march. 1879	W. ?	—	Trank statt Senna 30,0 grains unreine con- centrirte Carbolsäure

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
Breachmittel ohne Erfolg	Urin nach C. riechend, dunkel, einmal gelassen, später ver- geblich versucht. Puls nach 4 St. 106. Respiration stertorös 46—48. An Gesicht und Händen kalter klebriger Schweiß. Rückenschmerzen.¹ 4 Stunden lang bewusstlos, wie vom Schlag getroffen. Collaps.	Thromben in d. sinus longitud. In den Ventriceln u. Arach- noidealsack nach C. riechendes Serum. Venen am pons und med. obl. stark con- gestionirt. Leber und Nieren partiell ver- fettet. Lungen öde- matös. Im Herz beiderseits dunkles geronnenes Blut. Blutcoagula in Art. pulm.	† nach 14½ Std.
Milch und ein- hüllende Ge- tränke. Brandy	Schwarzbraune Stühle u. solchen Harn. Haut deutlich bläuliche Farbe.	—	†
Nach 18 Min. Magenaus- spülung (Wy- mann'sche) Aderlass von 1 Pfd. (nach C. riechend) so- fort zum Be- wusstsein	Kein Erbrechen oder gastritis. Puls kaum fühlbar, unregel- mässig. Respiration langsam, schnar- chend, stertorös. Extremitäten kalt. Krämpfe, intensiver Tris- mus.	Blut roch nach Carbol.	G.
Magenpumpe erfolglos	Harn nicht erwähnt. Puls 140 klein, sehr schwach. Dyspnoe, Athmung langsam, stertorös, nach C. riechend. Schmerzen. Stupor.	Blut riecht nicht nach Carbol.	† nach 12 Min.

Lauf. No.	Spec. No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung, Concentration
23	18	Krönlein, Berl. klin. Woch. 1873, p. 605	M. 69 J.	Zerfallendes Epi- theliom am l. sinus frontalis	1 Esslöffel concentr. Lösung krystall. Car- bolsäure statt Senna
24	19	Welandner, Hygiea XXXVI. Mars 1874	M. 30 J.	—	1 Esslöffel Carbol- lösung: ca. 0,25—0,30 gr. Acid. carb. Intox. nach 10—15 Min.

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
Venaesection, künstl. Erbr.	Blut stark venös, nicht nach C. riechend, langsam und un- vollkommen gerinnend, 150 gr. Harn in Farbe und Geruch normal. Puls rapid, unregelmässig 184 bis 204. Haut mit kaltem klebrigen Schweiss bedeckt. Bewusstlos. Collaps. Temp. in 2 St. auf 35,2. Frei von Convulsionen. Hoch verengte, reaktionslose Pupille, Cornea unempfindlich.	Oedem und Hyperae- mie der Lungen, Hyperaemie der Le- ber, Phenol im Blut chemisch nachge- wiesen.	† nach 2 Std.
Sofort Milch und Wasser, 1 Löffel Rici- nusöl, 1 Esslöff. Magnes.	Stuhl und Harn nicht nach C. riechend, H. schmutzigbraun, C. nachweisbar. Puls und Herzschlag nicht wahr- nehmbar, dann äusserst schnell und klein, unregelmässig. Nach 3 St. 120 und regelmässiger. Heftiger Schweiss, Venen auf- getrieben. Erbrechen nicht nach C. riech. Später somnolenter Zustand. Gelindes Zittern am ganzen Körper, das stärker wurde. Delirien, Toben, Aufregung. Pup. weit, reagiren.	—	G.

Lauf. No.	Spec. No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung, Concentration
25	20	Davidson, Med. Times a. Gaz. 1875, Nov. 27	W. 40 J.	Selbstmord	120,0 sehr concentr. Carbolsäure
26	21	Shaw, Lancet II, 13. Sept. 1875	W. 35 J.	—	Nahm aus Versehen 1 Unze Carbolöl 1:10,0 innerlich nüchtern. Intox. nach 12 Min.
27	22	Woodmann, Med. Times a. Gaz. Oct. 9. 1875, p. 421	? 7 J.	Periton. chron.	Hat rohe Carbolsäure verschluckt

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
20 Min. nach- her Magen- pumpe, Olivenöl	Stuhl schwarz, nicht nach C. riechend. Harn eiweissfrei, auf Schwefel- säure purpurrothe Farben- reaction, Puls beschleunigt, nicht fühlbar. Respiration stertorös. Haut bleich. Erbrechen. Bewusstlos. Convulsivisches Zucken der Glieder; Pupille verengt.	—	G. nach 2 Mon.
Magenpumpe, Einspritzung von Ammon in eine Vene, dar- nachBesserung	Puls schwach, kaum fühlbar. Gesicht schwärzlich. Völlige Bewusstlosigkeit. Pupille etwas erweitert.	—	G.
Eier, Olivenöl, Ricinusöl	Nach 4 St. Puls unfühlbar, Re- spiration 40. Nach 8 St. sehr beschleunigt. ebenso die Resp. Gesicht bleifarb., kalter Schweiss, kein Erbrechen. Bewusstlos. Pupille stier, erweitert, dann nach 4 St. contrahirt. Ein wenig herabgesetzte Sensibi- lität der Magenschleimhaut.	—	† nach 12 Std.

Lauf. No.	Spec. No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	K r a n k h e i t	Art und Dauer der Einwirkung. Concentration
28	23	Dessau, New-York med. Re- port, XIII, 1878, p. 289	M. 2 $\frac{1}{2}$ J.	—	Trank einen Thee- löffel Carbolsäure (Stärke: Calvert No. II) Intox. nach 10 Min.
29	24	Edgren, Hygiea XLIV, 12, Svenskalähares selbsk Förh S. 270, 1882	W. 7 $\frac{1}{2}$ J.	—	Trank aus einem Cog- nacglase eine Lösung von 9 Th. reiner C. und 1 Th. Spir.
30	25	B. Kirk, Glasgow med. Journ. XII, p. 432, 1881	W. 23 J.	—	Trank 60 gr. Cal- vert'sche Lösung No. 1

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
Ord.: Kalkwasser mit Oel und Eiweiss, künstliche Erbrechen, durch Reizung der Fauces	Urin schwarzgrün, keine freie C. drin. Respiration langsam, geräuschvoll. Gesicht, livide Farbe: Temp. Nachts 39 (im Rectum). Bewusstlos. Fibrilläre Muskelzuckungen in den Extremitäten. Augen starr, Pupille weit, reactionslos. Schaumiger Schleim in grosser Menge aus Mund und Nase.	—	G.
—	Urin dunkelbraun, roch nach C. Puls äusserst schwach. Respiration langgezogen, ungleichmässig, lautes Trachealrasseln. Temp. nicht erhöht, Extremitäten kalt. Bewusstlos, comatös. Reflexbewegungen aufgehoben. Pupille erweitert, schwach reagierend, später verengt.	In den Nieren Schwellung der Epithelien und Lymphoidenzellen.	† nach 10 Std.
—	Puls klein und unregelmässig, zwischen 40 und 100. Respiration; dyspnoisch (8 in d. Min.); später Cheyne-Stokes'sches Athmungsphänomen. Gesicht livid. Extremitäten kalt. Bewusstlos. Körper schlaff. Pupille reaktionslos.	Lungen congestionirt. Im rechten Herzen schwarzes flüssiges Blut, Leber congest., auf der Schnittfläche stark nach C. riechend. Nieren blutreich.	† nach 4 Std.

Lauf. No.	Spec. No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung, Concentration
31	26	Manouvriez, Annal. d. Hyg. IV. S. 1, No. 2, 1882	? 11 T.	—	Erhielt absichtlich mineral. Kreosot in den Mund. Intoxikation wenige Minut. später
32	27	Hagström, Hygiea XLV, 6, S. 357, 1883	W. ?	—	Trank 20,0 Acid. phenyl. dep.
33	28	Winslow, Philad. med. Times 1874, p. 817	M. 2 J.	—	Verschluckt 8,0 gr. Calvert's Phenol Nr. 4. Intox. sofort

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
—	Nahe am Ersticken, heftige Anstrengung zu athmen und zu husten.	Schaumige, grauröthliche Flüssigkeit in der Trachea und Bronchien. Im Herzen dunkles, halbgeronnenes Blut. Mageninhalt nicht nach Kreosot riechend, seine Wände sehr erweicht.	† nach 11 Std.
—	Sofort Schmerz im Epigastrium, Mund und Hals; Erbrechen $\frac{1}{2}$ St. später: Puls unfehlbar. Starke Dyspnoe, Schaum vor dem Mund. Haut cyanotisch, klebriger Schweiß. Bewusstlos, comatös. Temp. gesunken.	Nieren, schlaff, locker, schwarzbraun, In der Harnblase einige Esslöffel grünlich gefärbten Harnes.	†
Zuckerkalk. sich vorübergehend erholend	Cyanose. Tiefes coma. Klonische Convulsionen später tetanische Anfälle und Glottiskrampf. Mydriasis.	—	† nach 2 St. an zurückgebliebener Caryngitis

Lauf. No.	Spec.-No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung, Concentration
34	29	Friedberg, Virchow's Archiv 1883, p. 132	M. 23 J.	—	1 Esslöffel einer Lösung acid. carb. Glycerin. aa = 8,5 Acid carb. Intoxication bald darauf.

III. Intoxication

35	1	Michaelis, Wiener med. Presse 1867, Nr. 33	M. 10 J.	Fadenwürmer	Clysma, Acid. carb. XV gran, Aqu. 2 Unz. ca. 1,0 : 60,0
----	---	--	-------------	-------------	---

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
—	Im Urin kein C. nachweisbar. Puls kaum fühlbar. Athem mühsam, langsam ster- torös. Gesicht vorübergehend blau, Haut kühl. Bald bewusstlos, Collaps, grosse Muskelschwäche. Muskelzittern, Starrheit der Rückenmuskeln, auf Kitzeln der Schlundtheile vorüber- gehend krampfhafter Ver- schluss des Mundes. Dilirium, heftige Convul- sionen bes. der unteren Extremitäten. Pupille stark erweitert.	Section kein wesent- licher Befund.	† nach 12 Min.

durch Clysm.

Rasche Darm- entleerung, Milchclysma	Puls nicht fühlbar, Kalter Schweiss, complete Anästhesie. Speichel beständig über die Lippen fliessend. Bewusstlos, später krampf- haftes Zucken der Gesichts- muskel, subparalytischer Zu- stand. Pupille stark erweitert, Auge starr, reaktionslos.	—	† nach 2½ St.
--	--	---	---------------------

Lauf. No.	Spec.-No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung, Concentration
36	2	Pinkham, Carbolic. acid. as a poison. Philad. med. surg. Report. 25,26 1868, p. 489	W. 20 J.	Ascariden	Clyisma 145,0 grai Carbolsäure mit Glycerin
37	3	Lighfoot, Poisoning by local applicat. of carb. acid., Britt. med. Journ. Apr. 1870	?	?	Clyisma
38	4	Praetorius. Berl. klin. Woch. XVI. 15	W. 45 J.	schwächlich, Diarrhoe	Clyisma, $\frac{1}{4}$ Ltr. 1 proc. wässriger CarbolLösg., vermischt mit $\frac{1}{3}$ Ltr. sehr warmen Wassers. Intox. während des Einlaufs
39	5	Kottmeier, Berliner klin. Woch. XVI, 33	M. 3 J.	Oxyuris	Clyisma $\frac{1}{2}$ proc. Intox. während des Ein- spritzens

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
Rasche Ent- leerung des Darms durch Clys, mit Milch Amm, camph.	Nach 15 Min, eine enorme Menge Harn, eigenthümlich riechend, aber nicht nach C. (chemisch nicht untersucht). Puls schwach, flatternd. Respiration stertorös. Haut kühl und feucht. Bewusstlos. Sofort Convulsionen, Di- lirium. Pupille contrahirt.	—	G.
—	Respiration stertorös. Bewusstlos.	—	† nach 10 Min.
—	Schwindel, Ohrensausen, halb ohnmächtig, Schwäche.	—	G. nach 2 Std.
—	2 Stunden darnach deutlich schwarze Farbe des Harns. Puls fadenförmig, Haut blass, schlaff, kühl. Bewusstlos.	—	G.

Lauf. No.	Spec. No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung, Concentration
40	6	Medin, Hygiea XLV, 2, p. 125, 1883	W. 5 $\frac{2}{3}$ J.	Oxyuris	Clysmā: 2—3 gr. z Desinf. (bei Hebat men) gebräuchl. Ca bols. in wässr. Lösun Sofort Intoxication
41	7	Desplats, Schmidts Jahrb Bd. 194	?	—	Clysmā

IV. Intoxication

42	1	Küstner, Centralblatt für Gy- naecologie III, 14, 1878	W.	Puerpera, Puls 108	a) Irrigation mit 2% C b) Irrigation mit 5% C Intox. sofort
----	---	---	----	--------------------	---

Lauf. No.	Spec. No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung, Concentration
43	2	Küstner, Centralblatt für Gynaecologie III, 14, 1878	W.	Puerpera	Irrigation mit 2% C.
44	3	ibid. III, 15	W.	Puerpera, mehrgeb.	Nach der 3. Irrigation mit 2% C. 48 St. nach d. Part.
45	4	ibid. Fritsch.	W.	Puerpera, mehrgeb.	1 Min. lange Irrigation. Bekommt $\frac{1}{4}$ stündigen Intoxicansanfall
46	5	Herdegen ibid. III, 16	W.	Puerpera, 5 geb., Fieber, Parametritis	Irrigation mit 1% C. (28° R.) $\frac{1}{4}$ Ltr. durchgeflossen
47	6	ibid.	W.	Pnerp., erstgeb. Parametritis	Irrigation. Intoxitat. sofort
48	7	Bruntzel, Bresl. ärztl. Zeitschr. 5, 1879	W.	Puerpera 2 geb. Fieber	Nach der 2. Irrigation mit 1% Carbols. (1 Lt. Intox.)
49	8	Fürst, Mitth. d. Vereins d. Aerzte in Steiermark	W. 22 J.	1 gebärende Puerpera	Irrigation, Luft aus dem Schlauch völlig entfernt. Intox. sofort

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
—	Ein ähnlicher, aber schwächerer Fall.	—	G.
—	Hohe Pulsfrequenz. Bewusstlos. Gliedmassen schlaff, Augen halb geöffnet, lallende Töne.	—	G.
—	Gesicht leichenblass. Bewusstlos.	—	G.
—	Nach $\frac{1}{2}$ St. reichlicher Schweiss. $\frac{1}{2}$ Stunde lang bewusstlos. Klon. Krämpfe der oberen und dann der unteren Extremitäten. Verdrehen der Bulbi, Pupillen reactionslos. Nach 10 Min. Tobsuchtsanfall.	—	G.
—	Fliegender Athem, Cyanose, Pupille reactionslos. Klon. Krämpfe der Oberextremitäten.	—	G.
Reizmittel	Bewusstlos.	—	†
—	Sistiren des Athems. Bewusstlos. Collapserscheinungen.	Allgemeine Anämie und varicöse Entartung des plexus der rechten vena spermatica.	† nach $1\frac{1}{2}$ St.

Lauf. No.	Spec. No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung Concentration
50	9	Weber, Petersb. med. Woch. 1880, p. 328	W. 22 J.	Eireste im Uterus. Gonitis suppur., Temp. 40	a) Irrigation mit 1 C. 2 Ltr. b) mit 2 % $\frac{1}{2}$ Lt. c) 1 % C. Irrigation nachher 7 Tage tragen
51	10	ibid.	W. 19 J.	Erstgebärende schwere Geburt. Zurückgebliebene Eireste, anämisch, hysterisch	1 St. nach d. Geb. drei Irrigationen

V. Intoxication nach Application

52	1	Boboeuf, Memoire sur l'acide phénique, Paris 1865	?	—	Einreiben von „huile d'olive phéniquée“ die Brust
53	2	Lemaire, de l'acide phénique, Paris 1865	?	Lepra	Einreiben des ganz Körpers eines wachsenen mit V. aigre phéniqué 6:1
54	3	ibid.	?	„	„
55	4	ibid.	?	„	„
56	5	Smith, Lancet I, 2, 4, 5, Jan. 1880	?	Herpes tons. cap.	Carbols. Glycer. fortgesetzter Gebrauch auf die ganze rasierte Kopfhaut

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
—	Ertragen. Urin dunkel, tintenartige Farbe. Puls klein, kaum fühlbar, 58. Die exhalirte Luft hat C.-Geruch. Schwindel, Ohnmacht. Angen starr, Pupille erweitert, reactionslos.	—	G. nach einigen Std.
—	Harn dunkel. Puls sehr klein, 124. Athem riecht nach C. Unruhe, Empfindung eines rauschenden Regenfalls auf den Körper. Schüttelfrost. Temp. 39,5, nach einigen Stunden 37,5. Hysterische Anfälle.	—	G. nach einigen Std.

auf die äussere Haut.

—	Aeusserst heftig und lange erkrankt,	—	G.
—	Rasches Eintreten von Erscheinungen, die zum zu Bett gehen nöthigen.	—	G.
—	„ „	—	G.
—	„ „	—	G.
—	Intoxicationserscheinungen.	—	G.

Lauf. No.	Spec. No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung, Concentration
57	6	Lang, Ueber 2 schwere Prurigofälle. Wien, med. Woch. 1880, p. 525	M. 19 J.	Prurigo, schlecht genährt	Der ganze Körper jeden zweiten Tag m a) $\frac{1}{2}$ proc. C. b strichen u. mehrere Stunden in wollen Decken gehüllt, b) später wird di gleiche Behandl Monate lang e tragen
58	7	Tennent, Glasgow, med. Journ. 1870, p. 74	?	Ekzem an Armen und Beinen	Salbe. Acid. carb. Salbengrundlage 4 Intox. in kurzer Ze
59	8	Toel, Ein Beitrag zur Frage von den gift. Eigenschaften etc. Deutsch. med. Woch. 1878, p. 404	W.	Psoriasis syph., wohlgenährt	Verschiedene Körperstellen mit der starken selbstgelösten Säure bestrichen
60	9	Machin, Fatal cases of poisoning by the absorpt of carb. acid. med. Times and Gaz. 1868 p. 320	W. 60 J.	Scabies	Einreibung des ganzen Körpers mit Calvert sonst zur Desinf. benützter Carbonsäure (2 Unzen) beim Ofen
61	10	ibid.	W. 23 J.	"	"

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
—	Carbolismus.	—	G.
—	Röchelndes Athmen, tiefe Be- täubung.	—	Aus- gang nicht angeg. G.
—	Intoxicationerscheinungen so- fort, verschwinden aber nach einigen Minuten.	—	G.
25 Min. später Brandy, Amon. aeth.	Respiration mühsam, krampfhaft. Heftige Schmerzen, Kopfweh. Schwindel, bewusstlos. Krampf des Diaphragma's. Pupillen normal.	—	† nach 3½ St.
—	Brechneigung. Athem riecht nach Carbol. Schmerzen im Schlunde. Kopfweh, Schwindel, 5 Stunden bewusstlos. Epileptiforme Convul- sionen (angebl. eine Krankh. ihrer Kindheit).	—	† 14 Std. nach der Appli- cation

Lauf. No.	Spec. No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung, Concentration
62	11	Malchin, Fatal cases of poisoning by the absorpt of carb. acid. Med. Times and Gaz. 1868 p. 320	W. ?	Scabies	Einreibung des ganzen Körpers mit Calvert's, sonst zur Desinf. benutzten Carbolsäure (2 Unz.) aber nicht in der Nähe des Ofens
63	12	Köhler, Corresp.-Blatt des würt. ärztl. Vereins 1871—72	M. 21 J.	"	Einreiben d. 5. Theils einer wässrigen Lösg. (1; 8) ca. 13,37 gr. Intox. nach 5—7 M.
64	13	ibid.	M. 21 J.	"	"
65	14	Wicke, Deutsch. Klin. 19,20, 1869	M. 19 J.	Favus des Kopfes	Einreiben chemisch reiner, durch Erwärmen verflüssigter Carbols. auf $\frac{2}{3}$ der Kopfhaut mittels Pinsel: darüber Stanniol mit Ol. lin. 4: Acid. carb. 1. Intox. nach einigen Minuten

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
—	Normale Leibesöffnung, kein Erbrechen: Puls schwach, 80. Kopfweg, Gefühl eines Streifens um den Kopf, Schwindel wie betrunken, 4 Std. bewusstlos.	—	G. nach 3 W.
—	Harn und Stuhl normal. Keine Athembeschwerden, Kopfschmerzen, Schwindel, rauschartige Delirien. $\frac{1}{2}$ Stunde bewusstlos. Stierer Blick.	—	G. nach 2 Tg.
—	Nach Athem schnappend. Schwindel, rauschartiger Zustand, bewusstlos, stierer Blick.	Dunkel flüssiges Blut, Gefäße an der Basis des Hirns injicirt. In den Bronchien schaumiger Schleim, Lungenblutreich, besonders hintere Partien. C. in geringer Menge im Blut, zweifelhaft, ob in Folge der Vergiftung oder der Manipulation.	† nach wenig Minut. unter Erstickungserscheinungen
—	Sistiren der Respiration. Inducirt, u. constant, Strom erfolglos. Kopfschmerz, Schwindel. Muskel schlaff, Augen geschlossen.	Atrophie der rechten Grosshirn- u. linken Kleinhirnhemisphäre. Hirn blutreich. In Bronch. viel Schleim; Lunge, Leber, rechte Niere blutreich. Milz blass.	† nach wenig Minut.

Lauf. No.	Spec. No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung, Concentration
66	15	Zillner, Wiener med. Presse, 1879 p. 1233	W. 14 M.	Bronchialcatarrh	Begoss sich mit einer Ltr. ca. 30—40% C.
67	16	Haunhorst, Berl. klin. Woch.	W. ?	Phlegmone des Vorderarms	Einwicklung mit 15% C. getränkter Watteplatten. Intoxication nach wenigen Minuten

VI. Intoxication

68	1	Lawson Tait, Effects of carbolic. Med. Times and Gaz. 1868	M. ?	Grosse Wundfläche	Verband mit Carbollösung
69	2	James Wallace, Sympt. of carb. acid poisoning etc. Britt. med. Journal. April 1880	M. 5 J.	Skrophulöser Abscess, eröffnet unter Chloroformnarkose	Carbolöl- (1:8) Verband; jeden 4. Tag gewechselt 10 Wochen lang

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
Lauwarmes Bad. Thee mit ligr. ammon anis. Rum	Harn anfangs weisslich. am folg. Tage schmutzig braun. Puls schwach, nicht zu zählen. Die ganze Haut geröthet. Wimmern, tiefe Bewusst- losigkeit.	Im Herzen locker ge- ronnenes Blut und Faserstoffgerinnsel. Leber, Niere, Milz blass, Lunge von mittleren Blutgehalt, nirgends Geruch nach C., Pupille mittelweit, Hirn und Hirnhäute mässig blutreich. In den Blutleitern reich- lich locker geronne- nes Blut.	† nach 13 Std.
--	Puls langsam. Athem mühsam. Gesicht stark geröthet, später Stirnschmerz. Bewusstlos. Sich hin- und herwerfend. Pupille stark verengt.	--	G.

bei Wundbehandlung.

--	Pulslos. Sinken der Temperatur.	--	G.
--	Harn übelriechend, dunkel (1010 —15) kein Eiweiss. Erbrechen. Haut wachsbleich. Kachexie, Collaps, appetitlos. Schlingbeschwerden (Dysphagie).	--	G. nach Aende- rung d. Ver- bandes

Lauf. No.	Spec. No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung, Concentration
70	3	Rob. Lighfoot Poisonnig by local appl. etc. Britt. med. Journ. April 1870	?	Resectio des Ell- bogen u. Gelenkes	Verband mit wäss- riger Lösung 2:10 Intox. nach 72 St
71	4	Wilks, ibid.	M. ?	Decubitus nach Typhus	Charpie-Verband m Carbolöl 1:5
72	5	White, Poisonnig by the use of carb.etc. New-York. med. Gaz. April 1871 p. 274	M. ?	Nekrosis tibiae mit Fistelbildung	Lang fortgesetzte irrigation von Carbo- säure
73	6	Hamilton, Carb. acid as a cere- brospinal. Poison. Britt. med. Journal. March 1873	M. 4 $\frac{1}{2}$ J.	4 Zoll lange Inci- sionswunde	Verband mit Carbo- säure. Intox. nach 1 St.
74	7	Volkmann, Beiträge zur Chirurgie 1875 p. 167	M. 6 J.	Resectio	Verband nach List
75	8	Nussbaum, Chir.Klin. in München 1875 p. 30	W. 31 J.	Ovariectomie	Spray, Auswaschen d Bauchhöhle mit 2 $\frac{1}{2}$ % Carbolsäurelösung
76	9	Nussbaum, Ueber Shok grosser Verletz. etc. 1877	Junger M.	Incarceratio int. Laparotomie	Carbolspray, Lister- scher Verband

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
—	Anhaltendes, äusserst hartnäckiges Erbrechen. Puls schwach, 120—140. Haut kühl. Erschöpfung, Frostschauer.	—	G.
—	Urin dunkel. Anhaltendes Erbrechen.	—	G.
Brandy	Urin nach C. riechend. Puls schwach, kalte Extremitäten. Dyspnoe. Collaps, später nervöses Aufgeregtsein.	—	G. nach 4 St.
—	Haut kalt, livor faciei. Coma. Anaesthesie der Cornea.	—	† nach 3½ St.
—	Urin zuweilen dunkel, schwarzgrün. Erbrechen. Collapszustände, absoluter Appetitmangel. Wachsende Erschöpfung.	—	† nach 5 W.
—	Tiefer 4stündiger Collaps. Künstl. Respiration.	—	G.
—	Urin dunkel, Brechneigung. Ptyalismus.	—	G. nach Weglassung des Verbandes

Lauf. No.	Spec. No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung. Concentration
77	10	Rheinstädter, Acut.Carbolism. durch peritoneale Resorpt. Deutsche med. Woch. 1878 No. 25	W. 31 J.	Ausschälung eines retroceroicalen Fi- broides	Ausspülungen mit 1% Lösung. Eindringen der Flüssigkeit in die Bauchhöhle (etwa 500 10 gr. Carbolsäure)
78	11	Sonnenburg, Zur Diagnose und Therapie der Carbol- intox. Deutsche Zeit- schrift für Chirurgie. Bd. IX p. 362	W. 16 J.	Fisteln am Ober- schenkel	Ausspritzen mit 5% Carbollösung. Nach jeder Ausspritzung toxication
79	12	ibid.	M. 42 J.	Necrotomie	Carboljuteverband
80	13	ibid.	W. 7 J.	Caries der Wirbel- säule, Incision	Antisept. Verband
81	14	Küster, Archiv für klin. Chir. 23. April 1878 p. 122, von giftigen Eigen- schaften des Carbols.	W. 25 J.	Stricturen und Ulcerationen des Rectum	Rectotomie, Septic- pyämie, Fieber, Aus- spülung des Rect. mit 2% Carb., mehrere leichte Collapserschü- bungen. Nach 13 T. hochgradige Intox.
82	15	ibid.	M. 2 $\frac{3}{4}$ J.	Pleuritis	Doppelincision der Pleura mit Rippen- resection C. spritzte Auspülen der Pleura- höhle mit 2 $\frac{1}{2}$ % Während des Verbandes anlegens Intox.

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
—	Harn tiefgrün, Haut leichenblass, kalter Schweiß. Puls nicht zu zählen, minimal klein. Resp. anfangs ganz aussetzend, später verlangsamt, oberfläch- lich. Bewusstlos, tiefer Collaps, keine allg. Peritonitis; tonische Krämpfe der Ex- tremitäten.	—	G.
—	Kopfschmerz, appetitlos, Temp. erhöht.	—	G.
Natr. sulf. innerlich	Sehr dunkler Urin, Erbrechen.	.	G.
—	Hohes Fieber.	—	G.
—	Hochgradiger, mehrstündiger Collaps. Krämpfe sollen gesehen worden sein. Stecknadelkopfgrosser, nekro- tischer Fleck in der Cornea.	Tod unter pyämischen Erscheinungen. Um- fangreiche Jauche- höhle, in der Carbs. zurückgeblieben und resorbirt war.	†
—	Puls unfühlbar. Haut kühl, livor faciei. Sensorium benommen. Reflexerregbarkeit herabgesetzt. Pupille eng.	Keine Section.	† nach 3 St.

Lauf. No.	Spec. No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung, Concentration
83	16	Küster, Archiv für klin. Chir. 23. April 1822, p. 122, von giftigen Eigen- schaften der Carbols.	W. 39 J.	Necrosis os. ilii. Grosser Beckenab- scsess. Durchbruch nach der Blase, Schüttelfrost, be- nommenes Senso- rium. Eröffnung des Abscess	a) Ausspülung der Höhle mit 2 $\frac{1}{2}$ % Carbollösung, C spray; b) erholt sich am folgenden Tag Die Wunde wird der mit C. aus- gespült
84	17	ibid.	W. 23 J.	Metastat. Abscess unter den Gefäss- muskeln. Vereite- rung des linken Kniees, eine halbe Handgrosses brand- diges Geschwür d. linken Wade	Eröffnung der Ge- fässabscessus unter Chloroformnarkose Ausspülung mit 5 % C.-Lösung. Antisepti- scher Verband. Knie ebenso behandelt, das Geschwür ausgeschält und gewaschen. Intox. während der Operation
85	18	ibid. p. 138	W. 26 J.	Necrosis tib. Verei- terung d. Kniee- und Fussgelenkes. Amput. femoris	Antisept. Behandlung mit Carb. nach Lister später Salicylverband und Thymolspray
86	19	Weinlechner	? 4 W.	Gonit. suppur. 2 seitl. Incis. Drai- nage	Antiseptische Carbol- behandlung
87	20	Züblin, Schweiz. Corresp.-Bl. IV, 20, 1874	?	Uebelriechende Wunde mit vielen Sinuositäten	Starke Injektionen der Carbollösung

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
—	Puls kaum fühlbar. Plötzlicher Collaps. Reflexerregbarkeit fast erloschen. Temp. 35. Plötzlicher Collaps.		†
—	Puls sehr klein. Respiration mühsam. Gesicht blass. Bewusstlos, Collaps. Re- flexerregbarkeit erloschen. Eigenthümliche Starrheit der Muskulatur, leichte tonische Krämpfe derselben. Pupille contrahirt.	—	† nach 4 Std.
—	Urin dunkel. Häufiges Erbrechen. Abmagerung, appetitlos. Fieber nach 3 Verbandwechseln unter 5.	—	G.
—	Carbolismus.	—	G. nach Anwen- dung eines Salicyl- jutever- bandes
—	"	—	G.

Lauf. No.	Spec.-No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung, Concentration
88	21	Abelin.	? 7 W.	Varicellen, in Eiter übergegangene Pustel, erysipelatös geschwollene Umgebung T. 39,2	2% C.-Wasser mit Compressen auf die vereiterte Pustel $\frac{1}{2}$ Tag
89	22	H. G. Joseph, Bericht über die Erfolge des Lister'schen Verfahrens. Inaug.-Diss. Leipz. 1867	Kind a. b. c. d.	Kachektisch " Heruntergekommen "	Lister'scher Verband " " "
90	23	Steinitz, Inaug.-Diss. 1869	M. 59 J.	Abscess am Oberschenkel, Kachektisches Aussehen des etwas comatösen Kranken, phlegm. profund. fem. cum Septicaemie	Lister 2 Tage lang Darm-Verband mit Kalipermanganat. D. Intox. nach 4 T. vorüber. Carb. wird jetzt ertragen
91	24	Sandwell, Britt. med. Journ. Oct. 1, p. 382, 1870	W. 12 J.	Ulceration der Labien und Glutaeal-region	Hat auf einem mit C.-Säure betünchten Holzklotz und einem mit C. desinficirten Zimmer gesessen

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
Stimulantien	Urin schwarz, Erbrechen, Wimmern. Resp. langsam, stockend, mühsam. Haut kalt, gelblich weiss, klebriger Schweiss. Collaps, Schlingbeschwerden, dann Unmöglichkeit zu schlingen, Spasmodische Zuckungen der Augenlider und Augenäpfel: bisweilen Strabismus.	Oedem der Hirnhäute, Injection der Gefässe an der Basis und Convexität des Hirns. Nieren etwas vergrössert, tubuli contorti mit Fett erfüllt; ebenfalls Fettentartung in der Tub. rectis. Epithelzellen zerstört. Milz sehr blutreich.	† nach 23 $\frac{1}{2}$ Std.
—	Urin schwarz, C. nachgewiesen, eiweissfrei. Symptome nach 36 St. auftretend.	—	G.
—	" "	—	G.
—	Die Symptome treten erst später auf.	—	G.
—	" "	—	G.
—	Harn dunkel, fast schwarz, C. nachweisbar. Heftiges Erbrechen.	—	G. nach 4 Tgn.
—	Am nächsten Morgen die Epidermis in Blasen abgehoben, die bald in profuse Eiterung übergingen.	Entzündung des rectum, Dünndarms, der r. Pleura.	† nach 10 Tg.

Lauf. No.	Spec. No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung, Concentration
92	25	Land, Britt. med. Journ. Nov. 27, 1869, p. 583	W. 33 J.	Aneurysma d. Art. fem. Ligat. der Iliae ext.	Antiseptische Behandlung
93	26	Th. v. Genser, Vergiftung durch Car- bols. nach äusserer Anwend. ders. Arch. für Kindheilklin. 1, 1880, p. 459	kräftig. Knabe 14 Tg.	20 kr. grosse Ex- coriation in der r. Axilla mit einem missfarb. rüthlich- grauen Belag. Die Umgebung noch cr. 1 cm. weit, im Umfange stark ge- röthet	Mit 5% Carbolwasse befeuchtete Charpie
94	27	Zit, Zur Casuistik der Car- bols. intoxication bei Säuglingen. Arch. f. Kinderkrankh. I. 1880. p. 455	Kind 3 Tg.	Gut genährt, 4100,0, Nabelstumpf ge- röthet, geschwoll., dünnflüssigen Eiter secernirend, kleine oberflächl. Excoriationen, 0,5 Durchmesser. Temp. 37,5 (rect.)	a) Aufstreichen von 2% Carbolöl 3—4 mal tägl. Darüber dünne Lage Carbol- watte b) Am 3, häufiger und intensiver aufge- strichen und viel Watte darüber

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
— Campher mixt. Senfbad, Aqu. chlori.	Carbolintoxication. Urin dunkelbraun, Stuhl theils gelb, theils dunkelbraun. Im Harn sehr viel C. nachgewiesen. Unaufhörliches Erbrechen ohne spec. Geruch, Appetitlosigkeit. Herzschlag schwach, Respiration unregelmässig, Gesicht blass, verfallen. Am folgenden Tage die allgemeine Decke, eine eigenthüml. schmutzig bräunliche (Theer-) Farbe, Schwindlich. Plötzlicher Collaps. Temp. 35,1 im Rect. Nach 4 Std. Fraisenanfall, Muskelzuckungen der Extremitäten. Verdrehen der Bulbi, Nachts Convulsionen. Pupille sehr eng, reagiren. Ertragen.	— Decke des Stammes geröthet, Pup. mässig weit.	G. nach Beseitigung des Verb. † 24 Std. nach Auftreten der ersten Vergiftungsercheinungen
— Carbol fort., aromatisches Bad. Die Symptome dauern noch 2 Tage	Urinsecretion vermindert, dunkel. Zweimal Erbrechen von Schleim. Temp. 37,3 Morg. Puls nicht beschleunigt, ebenso die Resp. Wimmern, apathisch, unruhig, kein Fieber, Appetit.	—	G.

Lauf. No.	Spec. No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung, Concentration
—	—	—	—	c) Beide Brustdrüsen geröthet, geschwollen. Jodkalisalbe. Stuhl, Appetit gut	Carbolwatte drüber in solcher Ausdehnung, dass die ganze vordere Brustwand bedeckt ist. bleibt 12 St. liegen. dann gewöhnl. Watte
95	28	Svensson, Hygiea XLIV, 16. p. 597. 1882. Ars berättelse från sabbats bergs sjukhus i Stockholm 1881. p. 201	M. 1 $\frac{1}{2}$ J.	Grosse Wundfläche	Carbolspray 5 %, Bruchoperation, langwierig
96	29	Psilander, Hygiea XLIV, 12. p. 684. 1882	W. 17 J.	Empyem operat.	2,5 % Carbolspray beim Verbandwechsel
97	30	ibid.	M. 7 J.	"	"
98	31	Nieden, Berl. klin. Woch. XIX, 49	M. 37 J.	Resecito der 6. und 7. Rippe	a) 2 % Carbolinjection in die Höhle tägl. b) 3 % Carbolinject. Intox. sofort

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
—	Stuhl schlecht, grünlich unverdaut, Urinsecretion vermindert, dunkel wie das erste Mal. Zweimal Erbrechen von Schleim, immerwährendes Herausstrecken der Zunge. Apathisch, unruhig in der Nacht.	—	G. nach 4 Tgn.
—	Harn farblos, das Verbandzeug (eisenhaltige Borgaze) blau violett. Collaps.	Milz gross. Herz und Leber: acute allg. Degeneration, Nieren ebenso. In der Blase dunkler, eiweisshaltiger Harn.	† 26 St. nach der Oper.
Statt Carbols. nahm man Bor	Harn dunkel, eiweisshaltig. Erbrechen. Collaps.	—	G. nach 2 W.
„	Urin braun, Erbrechen.	—	G. nach einigen Tagen
—	Süsslicher Geschmack, Kopfschmerz, Eingenommenheit. Harn nicht untersucht. Starke Würgebewegungen, nachher Brechneigung. Puls aussetzend, klein, nicht sehr beschleunigt. Athmung stertorös, Kopfweh. Bewusstlos, Glieder schlaff, rechter Arm zuckt bisweilen. Pupille stark erweitert, reactionslos. Als er aufwachte, beide Augen erblindet, ophthalmoscopisch nichts verändert.	—	G. nach 4 Tag., alle Intox., Erscheinungen verschwunden

Lauf. No.	Spec. No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung, Concentration
99	32	Langenbach, Klin. Beiträge zur Lehre vom C. Berl. klin. Woch. 1878. p. 412	W. 5 J.	Coxitis. Eröffnung unter Chloroformnarc.	Desinfection d. Haut mit 5% C.-Lösung 2½% Spray. Incis- 3 cm. lang. C.-Irri- gation der Wunde 5% Verbandsstoff, 2% C. ausgewaschen, er- holt sich, am Mittag Erneuerung des Car- bolverbandes
100	33	ibid.	W. 28 J.	Elephantiasis des linken Beines. Exstirpat. der Ge- schwülste a) Vernähung der Wundränder, wodurch die Haut sich ge- spannt; b) auch Ausein- anderplatzen der Hautränder und Entstehen einer grösseren Ulcerations- fläche	Listerverband; bei jeder Erneuerung des Verbandes Intox., da- her Lister fortgelassen Wieder gelistert
101	34	Billroth, Chir. Klin. 1871—1876	M. 3 J.	Kalter Abscess am Oberschenkel, ge- öffnet mit 1 cm. langem Schnitt	Operation unter 1% Carbolspray. Protect.: Gaz. in 5% Carboll- lösung getaucht, da- rüber Firnissspapier u. Jute. Intox. nach 5 Stunden

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
—	Fortdauerndes Erbrechen und Würgen. Puls 120. Athem oberflächlich und schnell. Bleich, kühler Schweiß, Gesicht verfallen. Geringer Collaps, Temp. 36,4 (Abends.) Abends erneutes Erbrechen. Temp. 36,3, Nachts 37,3.	Section ergab nichts gegen Carbolvergiftung sprechendes.	† nach circa 18 Std.
—	Erbrechen; blass, Unvermögen der Nahrungsaufnahme. Kaum merkliche Erscheinungen.	—	G.
Wein, Essig- äther	Lässt schwarze dünne Stühle und Urin unter sich. Urin am 4. Tage hell. Fortdauerndes Erbrechen. Puls nicht zu fühlen, später bewusstlos. Nach 7 St. Collaps, Temp. 36,2 (5 Uhr Abend). Temp. 35,3 (6½ Morgen.) Unruhiges Hin- und Herwerfen.	—	G. nach 2 Tgn.

Lauf. No.	Spec. No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung, Concentration
102	35	Billroth, Chir. klin. 1871—76	W. 6½ J.	Resectio des Hüftgelenks. Langwierige Operation	2% Carbolspray. Verband mit Listergaze. Am Abend Verb. erneut. Intox. am folgenden Morgen
103	36	ibid.	W. 6 J.	Coxitis mit Abscess u. Fisteln. Später Resectio des oberen Femurendes, langdauernde Operation. Thymolspray Wunde mit Thymolausgewaschen.	4 Tage lang Ausspritzung der Fistel mit 5 % C.
104	37	ibid.	W. 18 J.	Schlecht genährt. Eiterung d. Kniegelenks. Lister bei Necrotomie gut ertragen	10—12 mal Ausspül des Gelenkes mit 5 % C. unter leichter Narcose. Listerverband. Intox. bald

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Gelesen
C. sofort durch Thymolersetzt	Harn dunkel olivengrün, am 8. Tage namentl. fortdauerndes Erbrechen dunkel olivengrüner Flüssigkeit. Uebelkeit. Temp. 39,8 (Morg.), 37,7 (Abd.) nie unter 36,9.	—	G. langs.
—	Olivengrüner, dunkelgrün. Harn. Schwarze diarrhoische Stühle (3 Wochen lang schwarz). Mehrere Erbrechen bisweilen schwarzer Flüssigkeit. Besinnungslos.	Später Sympt. einer Herderkrankung des Hirns mit Meningitis, Besserung; schliessl. Erysipel.	† nach fast 2 Mon. an Ery- sipel
—	Brechen. Puls sehr klein, kaum fühlbar. Resp. frequent, oberflächl., von Seufzern begleitet, Gesicht kalt, Schweiss. Bewusstlos. Temp. nach 3 Std. 35,0. Absolute Reactionslosigkeit, Leichte Zuckungen in den Ex- tremitätenmuskeln, besonders Vorderarm, die sich so stei- gern, dass Hand und Vorder- arm krampfhaft gebeugt ge- halten werden. Zähne fest zusammengepresst, Tonische Krämpfe im Arm. Pupille mittelweit, Augenlider offen, stets auf und ab bewegt.	Pup. eng. Mehrere in Communication mit der Kniegelenks- höhle stehende Abs- cesshöhlen mit röth- lich brauner Flüss. angefüllt; ebenso die Muskeln des Ober- schenkels, deutlich nach C. riechend. Gehirn blass. In der Trachea schaumige Flüssigkeit; Lunge stark ödematös. Im Herz theils flüssiges Blut, theils für frisch zu haltende Gerinn- sel. Leber, Nieren blass, fetthaltig. C. nachgewiesen in Le- ber, Nieren, Milz etc.	† 6 Std. nach der Opera- tion

Lauf. No.	Spec. No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung, Concentration
105	38	Billroth, Chir. klin. 1871—76	W. 50 J.	Carc. mammae extirpirt, 2 stünd. Operation	2% Carbolspray, Verband mit Listergaze. Intox. nach 6 St.
106	39	ibid.	W. 41 J.	Exstirpation eines Fibrosark, des Ovariums Recidive, Verjauchung desselben, Fistel	3 mal wiederholte Injection einer 3%igen Carbolsäure (grosse Menge). Abfluss unvollkommen. Intox. nach dem 3. Tage
107	40	ibid.	W. 43 J.	—	2% Spray, Listerverband, tägl. Injection einer 2% C. Intox. (abgesehen vom Harn) nach 5 Tage
108	41	ibid.	M. 21 J.	Exarticulation des l. Oberschenkels, wenig Blutverlust, Oper. 5/4 St. lang	2% Carbolspray, Ausspülung der Wunde mit 5% C. Verband mit 5% eingetaucht. Am folgenden Tag Erneuerung des Verbandes. Intox. nach 2. Tage

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
Gaze entfernt, Acid. sulf.	Fortwährender Drang zum Stuhle und Urin. Harn noch mehrere Tage nach Entfernung der C. schwarz. Erbrechen öfter. Puls kaum fühlbar, Gesicht und Extremitäten kalt. Bewusstlos.	—	G.
—	Harn dunkel olivengrün (nach einigen Tagen wiedernormal). Kopfschmerz, am dritten Tage somnolent. Temp. stets hoch, schlaflos. Am 5. Tage epileptiforme Anfälle. Pupille etwas erweitert, reagirt.	—	† am 6. Tage
—	Harn sofort dunkelschwarzgrün, später mit Blut gemischt. Schwarze Stuhlgänge. Er- brechen schwarzer Flüss.	—	† am 10. Tage
—	Urin dunkel, olivengrün. Fortdauerndes Erbrechen schwar- zer Flüss. Somnolenz, grosse Unruhe.	—	† am 3. Tage

Lauf. No.	Spec. No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung Concentration
109	42	Billroth, Chir. klin. 1871—76	M. 74 J.	Verbrennung der Haut des l. Oberarms und Thoraxseite (Mittelstadium zwischen Blasenbildung und totaler Cutiseschara)	Waschen der verbrannten Partie 5% C. Verband Listergaze. Intox. nach 10 S
110	43	Med. Centralzeitung 1880	?	Kleine eiternde Stelle	Mit 88 % roher betropften Compressen. Intox. sofort
111	44	Virchows Archiv 85, p. 240	M. 5 J.	Leukophlegmatischer Habitus	—
112	45	Riedel, Centralbl. f. Chir. 1880	M. ?	Resectio des Kniegelenks	—
113	46	Weiss, Prag. med. Woch. 1878, p. 369	M. 10 T.	Rituelle Beschneidung, Wunde rein	Acid. carb. gr. 2:2 auf Compressen, über eine Lage desinficirter Watte. Acid. carb. gr. 6:20 davon $\frac{2}{3}$ verbraucht. Intox. am folg. T.

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
—	Halbbewusstlos, coma- töser Zustand. Collabirt rasch. Temp. 35.	—	† nach 20 Std.
—	Todtenähnlicher Schlaf.	—	† nach wenig Std.
—	Einige Stunden nach dem Ver- bandwechsel auftretender Car- bolismus; Bewusstsein bleibt klar bis zum Tode.	—	†
—	Fortwährendes Erbrechen bald nach der Operation. Collaps am 2., bewusstlos am 3. Tage.	—	† am 3. Tage
Bad 27°. 10 Min. Cly- ssa 0,2 Chloral, Natr. sulf. 1,0 : 50,0	Ertragen. Urin schwarzbraun, sauer, 1004 gr. etwas Albuminurie. Nach 2 Tagen 2 weiche Stühle. Temp. 18,8, Puls 156. Athem beschleunigt, oberflächl. Haut mit Schweiss bedeckt, leicht icter. gefärbt. Lippe leicht cyanotisch, mehr- mals heftiges Erbrechen. Appetitlos, heftige Convul- sionen, Trismus, convul- sivische Zuckungen der Ge- sichtsmuskeln, Bauchmuskeln gespannt, Eclamptischer 3 4 M. dauernder Anfall. Nystagnus, Pup. mittelweit, schwach reagierend.	—	G. nach 2 Tg.

Lauf. No.	Spec. No.	Beobachter und Quelle	Alter und Geschlecht	Krankheit	Art und Dauer der Einwirkung, Concentration
114	47	Volk mann, Beiträge zur Chir. S. 42	M. ?	Knabe sehr redu- cirt; Operation	—
115	48	Lossen, deutsche Zeitschr. für prakt. Med, 1878, p. 221	M. 12 J.	Caries des Knie- gelenks	Ausspülung mit 5 C.; Antiseptische Verband
116	49	Sectionsjournal des pathol. Institutes München, Nr. 85, 1883	M. 6 ³ / ₄ J.	2 qucm. grosse Brandwunde 3. Grades	Ziemlich concentrir Carbolöl; 3stündl. neuert; 1 Tag braucht

Therapie	Symptome	Section	Tod oder Genesen
—	In den folgenden Tagen die sonderbarsten Collapserscheinungen.	—	G.
—	Erbrechen, Sopor, Sinken der Temp. von 40° zu 37° zu 35°.	—	† nach 36 St.
Salicylborverband; Weglassen des Carbols	Erbrechen, erhöhtes Durstgefühl, später bewusstlos; wiederholt tonische und klonische Krämpfe in den Extremitäten; Verdrehen der Augen. Puls nicht fühlbar, Herzaction arhythmisch. Cheyne-Stokes Athmungsphaenomen; Extremitäten kalt, Rumpf brennend heiss. Lässt tiefgrün gefärbten Harn unter sich gehen.	Hirn und -Häute hyperämisch, ebenso die rechte Lunge, Leber und Milz; Milztumor Nieren graublau.	†

Ich habe dieser Casuistik noch hinzuzufügen, dass Asché glaubt, mit höchster Wahrscheinlichkeit den Tod eines Kranken auf Carbolintoxication zurückführen zu müssen; sowie zwei Fälle, die nach der Ansicht Küster's hierherzählen. Der eine betrifft einen kräftigen Arbeiter, durch grossen Blutverlust sehr anämisch, aber ohne Schokerscheinungen: complicirte Fraktur des rechten, Amputation des linken Unterschenkels; Waschung der Wunde mit 5% Carbollösung. Verband mit Lister'scher Gaze; Puls klein, schnell. — Nachts mässige Nachblutung; unter Spray Unterbindung, eine Stunde dauernd, bald nach der zweiten Operation Collaps und Tod. Für den Collaps kann Küster keine andere Erklärung als Carbolintoxication finden. Der zweite Fall betrifft eine 22jährige sehr schwache Frau, bei der die Exarticulation des Kniegelenkes gemacht war. Köhler*) sagt von ihr: Vom Tage der Operation täglich sich mehrmals wiederholendes Erbrechen, das unmittelbar und nach jedesmaliger Nahrungsaufnahme eintrat; so wurde durch Inanition nach und nach ein collapsähnlicher Zustand und nach 9 Wochen der Tod in Folge Erschöpfung herbeigeführt. Küster meint den Fall als Carbolmarasmus deuten zu dürfen.

Fuller sah verschiedentlich Ohnmachten nach dem Zerstäuben von Carbollösungen von 5 — 10 Tropfen auf 1 Unze Wasser.

Die Fälle von Fritsch, Herdegen, Benetzes No. 45—48 habe ich der Vollständigkeit wegen anführen zu müssen geglaubt, trotz der abweichenden Deutung dieser Autoren; um so mehr als Müller hier seine in ähnlicher Weise aufgeführten Fälle den

*) Köhler, Die wichtigeren Vorkommnisse u. s. w. III. Bd. der Berliner Charité-Annalen. P. 477.

Namen Carbolismus (acutissimus) beibehalten hat. Ich habe daher die durch Uterusirrigationen veranlassten Vergiftungen zu einer Gruppe vereinigt und besonders gezählt.

In 2 Fällen, No. 16 und 31, fand die Vergiftung durch Kreosot statt; beide endeten tödtlich.

Von Interesse ist die vorübergehende Erblindung bei No. 98, der milariaartige Ausschlag von No. 11, der nach 4 Tagen auftretende reichliche Urticaria-Ausschlag in No. 40, sowie die schwärzliche Verfärbung des Gesichtes bei No. 26 nach interner Application und der ganzen Haut bei No. 93 (chirurg.). Die nach chirurgischer Behandlung aufgetretene Necrosis corneae (No. 81) ist wohl als Folge einer tiefgreifenden Nutritions- und Circulationsstörung aufzufassen. Je zweimal nach chirurgischer Behandlung (No. 69 und 88) und nach innerlicher Application ist Dysphagie bemerkt. Ptyalismus kommt in No. 35 (clysm.) und 76 (chirurg.) vor. Delirien treten in No. 34 (innerl.), 36 (clysm.), 63 (ent.) auf. Carbolgeruch des Harnes wird von No. 29, des Athems von No. 22 (int.), 50 (irrigat.), 61 (ent.), des Blutes von No. 21 (int.), der Leber von No. 30 (int.), von Hirn und Lungen No. 10 (int.) angegeben. Durch innerliche Application ist in No. 13 eine Cystitis beseitigt. Alle Intoxicationen nach Uterusirrigationen waren von dem Gefühle eines rauschenden Regenfalles auf den Körper begleitet. Ein eigenthümliches Symptom ist das stete Herausstrecken der Zunge bei No. 94, welches Zitz als characteristisch für Carbolintoxication bei Kindern ansieht, ein Phänomen, welches ich sonst nirgends verzeichnet gefunden habe. Werth hervorgehoben zu werden, ist der Umstand, dass von Machin's drei Fällen derjenige mit dem Leben davon kam, welcher sich nicht in der Nähe des Ofens befand (No. 62). Vielleicht, dass bei den andern die Inhalation

der in der Nähe des Ofens sich mehr verflüchtigenden Carbolsäure die Intoxication erschwert hat. In einer Schrift Koch's*) finde ich die Bemerkung, dass bei gleicher Menge Carbolsäure in Dampfform die Wirkung mit zunehmender Temperatur schnell gesteigert wird. Möglich, dass dies auch in toxischer Beziehung der Fall ist und hier zur Geltung kam.

Aus unserer oben aufgestellten Berechnung hatte sich ergeben, dass Convulsionen durchschnittlich in ca. ein Drittel der schweren Fälle auftreten. Die Todesfälle vertheilen sich, ebenfalls in Procenten auf die schweren Fälle zurückgeführt, folgendermassen:

Inhalationen	0:2	
interne Application	13:20 =	65,00 %
Clysmata	2:7 =	28,57 %
Uterusirrigation	2:8 =	25,00 %
Application auf die äussere Haut	5:9 =	55,55 %
antiseptische Wundbehandlung	19:28 =	67,8 %

und das Vorkommen von Erbrechen:

Inhalationen	—	
interne Application	5:28 =	17,8 %
Clysmata	1:7 =	19,3 %
Uterusirrigation	—	
Application auf die Haut	1:16 =	6,25 %
antiseptische Wundbehandlung	22:48 =	45,8 %

Die Pupillen sind 8mal als contrahirt und 10mal als dilatirt bezeichnet. Die Temperatur ist nur 3mal erhöht angegeben. Vor allem die Application auf die äussere Haut, dann die innerliche sind von Schwindel gefolgt.

Carbolöl, das nach den Versuchen Koch's nicht die geringste desinficirende Wirkung entfaltet, und von

*) Arbeiten des Reichsgesundheitsamtes 1881.

welchem man dementsprechend auch keine toxische erwarten sollte, hat durch äussere Application drei Vergiftungen herbeigeführt: in No. 52 durch Bestreichen der intacten Haut; in No. 69 und 71 durch Verbinden von Wunden in bedeutender Concentration. Alle drei genasen. Die Erscheinungen bei dem 5jährigen Knaben in No. 69 waren heftiger Natur. In dem Falle von Zit (No. 94) traten Symptome von Vergiftung auf nach combinirter äusserlicher Anwendung von $2\frac{1}{2}\%$ Carbolöl und von Carbolwatte, die heftigern Erscheinungen aber erst nach alleiniger Anwendung von Carbolwatte.

Durch die Güte des Herrn Prof. Dr. Bollinger bin ich in der Lage einen weitem, recht charakteristischen Fall*) von Vergiftung mit Carbolöl veröffentlichen zu können, der am 24. Februar 1883 hier zur Section kam.

Wiendl Johann, Maurerskind, $6\frac{3}{4}$ Jahr alt, hat sich durch sein in Brand gerathenes Hemd am 22. Februar in der Früh, untenbeschriebene Brandwunden zugezogen. Ein sofort herbeigerufener Arzt verordnete auf die ca. 2 □cm. grosse Brandwunde 3. Grades am linken Oberschenkel ziemlich concentrirtes Carbolöl mit der Weisung, 3—4 mal täglich den Verband zu erneuern. Die genaue Zusammensetzung des Carbolöls liess sich nicht ermitteln. Die Eltern tränkten mit dem Oel in überreichem Masse grosse Wattestücken, die sie auf die Wunde legten. Morümpulver wurden nicht verabreicht. Um $11\frac{1}{2}$ Uhr Vormittags des 23. Februars traten Krämpfe auf, denen Erbrechen vorausging. Bis zu dieser Zeit war Patient bei Bewusstsein und hatte fortwährend erhöhtes Durstgefühl. Als der Kranke Mittags gegen 2 Uhr in Dr. v. Hauner's Kinderspital aufgenommen wurde, zeigte sich folgender Befund.

*) Sections-Journal des Pathologischen Instituts No. 85. 1883.

Patient ist ganz bewusstlos; Puls nicht fühlbar; Herzaaction sehr arhythmisch. An der Vorderfläche des linken Oberschenkels findet sich eine ca. 2□ cm. grosse Brandwunde 3. Grades. Am Abdomen eine geringe Anzahl von Stellen (bis zu 8), in denen bis zu halblinsengrosse Bläschen im Horizontalen ca. 4 cm. langen Linien aneinandergereiht sind. Die Rückenfläche sämtlicher Finger der linken Hand sind mit Brandwunden 2. Grades, des Mittelfingers mit einer 3. Grades bedeckt.

Ordination: Salicylborverband.

Es treten schon zum drittenmale Krampfanfälle auf: tonische und klonische Krämpfe in den Extremitäten, Herumwerfen des Kopfes, Verdrehen der Augen. Aus dem Munde tritt Schaum. Cheyne-Stokes Athmungsphänomen. Patient lässt tiefgrün gefärbten Harn unter sich gehen, auch der Koth ist nicht von normaler Farbe. In grosser Menge entweichen Flatus von übelstem Geruche.

Temp. 40,1 Mittags,

41,3 Abends 6 Uhr.

Abends 6 Uhr: Patient seufzt fortwährend auf. Die Bulbi sind in Zwangsstellung. Extremitäten eisig kalt; der Rumpf brennend heiss. Der Tod erfolgt um 6³/₄ Uhr, ohne dass noch Krämpfe vorausgehen.

Sectionsbefund vom 24. Februar 1883: *)

Ziemlich gut gebaute und mässig gut genährte Leiche. Bulbi etwas divergent. Dura stark gespannt; im Sinus longitud. dunkles Blut und wenig Gerinnsel; Dura hyperämisch; Innenfläche etwas getrübt; die weichen Hirnhäute stark injicirt und milchig getrübt. Blutleiter an der Basis gefüllt mit schwarzblauem, dickflüssigen Blute; Gefässe an der Basis fast leer.

*) Sections-Journal Nr. 85. 1883.

Gehirn mässig blutreich. Adergeflecht sehr hyperämisch. In den Seitenventrikeln nur einige Tropfen gelbliches Serum.

Linke Lunge etwas blass, nach vorn anämisch und ziemlich trocken; rückwärts Hypostase. In der Pulmonalis dunkles, dickes Blut. In den Bronchien brauner Schaum. Rechte Lunge hyperämisch, eine kleine Partie blaugrau, atelectatisch. Der Unterlappen zeigt nach rückwärts einige subpleurale Ecchymosen. Aus den Bronchien dicker Eiter. Im Hauptbronchus brauner Eiter. Schleimhäute hyperämisch.

Im Herzbeutel ca. 20 cm. klares Serum. Alle Abtheilungen mässig vergrössert. Im Herzen speckiges Gerinnsel, wenig cruor und kein flüssiges Blut. Das Endocard des linken Ventrikels ist fast weissgrau durch Verdickung.

Leber gross, blutreich; acinöse Zeichnung verwaschen; dunkelbraunroth. Milz bedeutend vergrössert, blutreich. Gewebe der Nieren graublau. In der Harnblase finden sich ca. 30 cm. eines schwefelgelben, mässig sedimentirenden Harnes. — Im Endtheile des Pleum schwarzgrauer Koth: Solitärsollikel daselbst geschwollen. Schleimhäute blass, Gedärme mässig gashaltig.

Die pathologisch-anatomische Diagnose lautete: Allgemeine Hyperämie des Gehirnes, Bronchitis purulenta. Milztumor.

Charakteristisch für dieses Krankheitsbild ist die Intensität der Krämpfe, wodurch es viel Aehnlichkeit gewinnt mit den Fällen von Weiss (Nr. 113) und v. Gensor (Nr. 93), sowie die tiefe und lange Bewusstlosigkeit. Auch das Erbrechen vermessen wir nicht. Das Cheyne-Stokes' Athmungsphänomen theilt unser Fall mit dem von Kirt (Nr. 30). — Ganz neu

tritt uns hier das Phänomen des äusserst übelriechenden Flatus entgegen.

Ueberraschend ist die intensive toxische Wirkung, welche hier eine immerhin gering zu nennende Menge Carbolöl bei einem kräftigen, gut genährten 5 jährigen Knaben nach eintägigem Gebrauche auf einer kleinen Brandwunde entfaltet. Unser Fall weicht darin wesentlich von den übrigen durch Carbolöl herbeigeführten Vergiftungen ab (Nr. 52, 69, 71, 94), obgleich bei Nr. 69 und 71 die Concentration eine beträchtliche war. Die in Nr. 94 beschriebene Intoxication ist vielleicht gar nicht hierher zu rechnen. Diese Krankengeschichten berechtigen nicht zu der Annahme, dass Carbolöl in toxischer Beziehung intensiver wirke als Carbolwasser, was angesichts des Mangels desinficirender Wirkung auch kaum zu erwarten war.

Um zu erfahren, wie Kaninchen gegen eine Ueberschwemmung von 5 % Carbolöl über Brandwunden reagierten, machte ich folgende Versuche. Ich erzeugte an der medialen Fläche eines Oberschenkels in der ungefähren Grösse eines Dreimarkstückes nach sorgfältiger Beseitigung der Haare eine Verbrennung

- 1) durch kochendes Wasser,
- 2) durch das Brennen einer aufgelegten mit Weingeist befeuchteten Oblate,
- 3) durch das Glüheisen,
- 4) machte ich eine Blase durch mehrstündiges Liegengelassen eines empl. canth.


Auf die verletzten Stellen legte ich mit 5 % Carbolöl äusserst verschwenderisch getränkte Wattestücke und erneute den Verband dreistündig während 2—3 Tage. Die Versuche verliefen alle resultatlos. Die Thiere blieben munter, behielten gleiche Temperatur und Anzahl der Herzschläge. Nur einmal zeigte der

Urin eines Thieres eine grünlich gelbe Farbe; zur chemischen Untersuchung war die Menge zu gering.

Die Sectionen lieferten kein anderes Resultat.

Schliesslich erfülle ich eine angenehme Pflicht, indem ich meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor O. Bollinger, für die mir gütigst gewährte Unterstützung meinen ergebensten Dank ausspreche.

A. J.



Berichtigung.

Fall	3	Rubrik	5	auf	Seite	16	lies	Phthisis.	
"	33	letzte	Rubrik	"	"	33	"	Laryngitis.	
"	40	Rubrik	8	Zeile	13	"	39	" Rect. statt red.	
"	42	letzte	Rubrik	auf	"	39	"	uteri " ukr.	
"	62	Rubrik	3	"	"	46	"	Machin statt Malchin.	
"	66	"	7	"	"	49	"	liq. statt ligr.	
"	88	"	9	"	"	57	"	in den Tub. statt in der Tub.	
"	90	"	6	"	"	56	"	Dann Verband statt Darm- Verband.	
"	91	"	6	"	"	56	"	Holzklötz in einem statt und einem.	
"	92	"	5	"	"	58	"	Iliaca ext. statt Iliac.	
"	93	"	8	Zeile	14	auf	Seite	59	lies Rect. statt Red.
"	93	"	8	"	20	"	"	59	" Pupillen statt Pupille.
"	98	"	5	auf	Seite	60	lies	Resectio statt Resecito.	
"	100	"	5	"	"	62	"	sich anspannt statt sich gespannt.	

